

L'information en français

RFHB

L'association nationale suédoise pour des familles avec les enfants infectés par Hépatite-B

Questions communes

1. Quel est hépatite-B?

Hépatite-B est un d'un certain nombre d'infections virales qui peuvent causer l'ictère. Le virus se produit dans le monde entier.

Seulement certaines de ceux qui ont été infectés développent tous les symptômes du tout. Très un peu développe une affection hépatique chronique, qui signifie que le virus peut rester dans le sang pendant une longue période après. Les enfants deviennent rarement malades. Ceux qui ont été infectés à la naissance, cependant, courent un gros risque des porteurs à long terme devenants et peuvent maintenir le virus pour 10 d'années. La transmission de la maladie exige que le sang d'une personne déjà infectée de façon ou d'autre entre dans la circulation sanguine du " récepteur " (par une coupe ou quelque chose de semblable).

Les contacts sexuels sont source connue d'infection pour des adultes.

2. Hépatite-B est-il commun?

Le virus se produit au-dessus du monde entier. Il a été estimateed cela plus de 350 millions de personnes ont été infectés. Hépatite - l'infection de B est plus commune dans la plupart des pays qu'elle est en Suède. On l'estime qu'il y a environ 15.000 personnes infectées en Suède.

3. Vaccination?

Un vaccin existe qui est usully recommandé aux personnes qui sont considérées comme courires un risque continous et à long terme d'infection. Par exemple, les enfants sous l'âge de trois, par l'expérience antérieure, se sont avérés risque d'infection pour leurs propres familles. La famille que les membres sont offerred alors le vaccin. Le vaccin s'est également avéré pertinent s' il est donné peu de temps après qu'il y ait eu une infection possible de chanceof. Hépatite - B relève de la juridiction de la loi sur les maladies d'infection. Ce moyens, parmi des choses d'ather, que les membres de famille ont le droit de libérer des medicalexaminations et la vaccination.

4. Assistance à l'enfance publique?

L'office national du bien-être social a, en réponse à la nouvelle loi sur les maladies infectieuses, révisées ses recommandations généraux précédents sur des hépatite - les nouvelles recommandations générales de B. These sont entrées en vigueur pendant 1991. La plupart des experts considèrent le risque pour la diffusion du virus de hépatite-B dans l'école et les systèmes d'assistance à l'enfance pour être non significatifs. En règle générale, des enfants qui sont au-dessus de trois-année-vieux et portent le virus, sont permis l'accès au système d'assistance à l'enfance après un examen médical (pour des agencements spéciaux d'enfants plus en bas âge sont essayés d'être faits.)

La bonne hygiène totale et stafftraining approprié peuvent plus loin réduire le risque de transférer le virus de hepatitis-B. Par conséquent, la vaccination des amis et/ou le personnel n'est pas usully recommandée comme mesure courante. Mais elle peut être recourue si, malgré tout, il y a eu un cas de l'infection possible.

5. Que se produit après?

L'infection avec hepatis-B ne nécessite normalement aucune restriction dans l'enfant instruisant ou choix de vocation. Quand un porteur de hepatitis-B atteint le puberty, le médecin de traitement devrait fournir des informations sur le risque de transmission sexuelle de hepatis-B

6. Que diriez-vous du secret?

Des informations sur des résultats d'examen ne peuvent être fournies à n'importe qui autre que les patients ou leurs gardiens juridiques.

Selon la loi sur les maladies infectieuses, un docteur doit registre un cas de l'infection par hepatitis-B avec le docteur du comté responsable des maladies infectieuses et avec le laboratoire bactériologique national suédois.

7. Que diriez-vous de l'hygiène?

Le sang devrait toujours être considéré comme infectieux. Un peu de sang peuvent obtenir sur des articles de toilette et pour cette raison ils devraient jamais ne dehors être prêtés ni empruntés. De même les règles suivantes devraient toujours être suivies dans la maison:

- toujours blessures ouvertes de bandage

- blessures de s rincez toujours enfant des ' avec de l'eau froide avant d'utiliser un désinfectant (chlorhexidine)

- ayez toujours contenir prêt de sac:

chlorhexidine (pour l'usage sur la peau)

chloramine-solution (pour l'usage sur des meubles et d'autres montages)

gants jetables

sachets en plastique

bande-aides

coton

towlette moite (contenant le chlorhexidine)

8. Ce qui si un accident se produit?

Si un accident se produit et le sang est dessiné, alors prenez les mesures suivantes. (des gants devraient être portés en traitant la victime) essayez d'arrêter le saignement dedans en tant qu'undramatic une façon que possible. Enlevez le sang en utilisant le

savon et arrosez. Soyez sûr de mettre un bandage approprié sur même les plus petites blessures.

Emballez n'importe quel matériel souillé avec le sang dans des sachets en plastique avant de le jeter dans la poubelle.

Machine-lavez l'habillement sali dedans en tant qu'eau chaude que possible. Utilisez les gants si le vêtement doit main-être lavé. Le sang sur des meubles ou d'autres montages est enlevé avec la solution de a (1:10) du chlore. (1 part de chlore à 9 parts d'eau)

L'association nationale suédoise pour des familles avec les enfants infectés par Hepatitis-B a produit cette brochure pour ses membres avec l'aide financière de la transmission suédoise d'état trouvée.

L'association fournit le conseil, l'aide et les informations à ceux infectées en hepatis-B et leurs familles.

RFHB fonctionne pour la non-discrimination de ceux atteinte de HBV. Nous coopérons avec d'autres organismes intéressés afin de réaliser nos buts.

[e-mail](#)